

# NUEVO TRANQUILIZANTE DETECTADO EN EL INCREMENTO DE SOBREDOSIS Y SUMINISTRO DE DROGAS EN CHICAGO

## RESUMEN

- En Chicago, hubo un incremento de sobredosis entre el 11 y 13 de mayo.
- La gente que sufrió de sobredosis experimentó palpitaciones lentas, baja presión sanguínea, respiración lenta y pupilas pequeñas (parte oscura en el medio del ojo).
- **El suministro de drogas está cambiando en Chicago.** Hemos visto nuevas drogas como xilazina, nitacenos, benzodiazepanes, y medetomidina mezcladas con otras drogas como fentanilo y heroína.
- **Puede asumir que cualquier droga vendida como heroína, percocet y otros opioides puede contener fentanilo.**
- Medicinas (buprenorfina o metadona) pueden tratar la abstinencia y proteger contra una sobredosis de opioides.
- Use tiras de pruebas de fentanilo y xilazina para asegurarse que no los está consumiendo accidentalmente.

## ALERTA DE DROGA:MEDETOMIDINA

- **Medetomidina, un potente tranquilizante animal, fue encontrado en drogas en Chicago a partir del 11 de mayo del 2024.**
- **Medetomidina puede causar sobredosis.** Señales de sobredosis incluyen sueño extremo, contracciones, palpitaciones y presión sanguínea preocupantemente bajas y respiración lenta, especialmente cuando opioides se encuentran presentes.
- No existen tiras de prueba para la medetomidina o medicina que pueda revertir una sobredosis.
- **Llame al 9-1-1 y use Narcan para cualquier sobredosis.**

## DONDE OBTENER AYUDA




### Recuperación Asistida por Medicamentos Now (MAR NOW)

MAR NOW es la línea de ayuda para el tratamiento de opioides de Illinois.

Para comenzar a tomar buprenorfina o metadona, llame

833-234-6343 o envíe un mensaje de texto con "AYUDA" al 833234.



Lleva Narcan, el medicamento que revierte una sobredosis de opioides

Naloxona (Narcan) gratuita está disponible en Chicago.

Visite [bit.ly/FindNarcan](https://bit.ly/FindNarcan) para encontrar Narcan cerca de usted.

## LO QUE PUEDE HACER

### USE TIRAS DE PRUEBA DE FENTANILO Y XILAZINA

Incluso si el resultado de la tira de prueba es negativo, es posible que todavía haya medetomidina presente.



USE DESPACIO



NO LO USE SOLO



LLEVA NALOXONA

